


RECALL

onderzoek



**Rivastigmine tegen verwardheid (delier)
ten gevolge van ECT bij depressie**

Electroconvulsietherapie (ECT) als behandeling voor ernstige depressieve stoornissen bij ouderen is zeer effectief. Bij 15% van de ouderen die ECT krijgen kan er tijdelijke verwardheid (delier) en geheugenproblemen optreden. In de RECALL-studie wordt onderzocht of het medicijn Rivastigmine helpt bij het verminderen van deze klachten bij ECT.

Wie kan er meedoen?

Patiënten van 55 jaar of ouder die, i.v.m. een depressie, met ECT worden behandeld worden gevraagd voor deelname aan deze studie.

Wat houdt deelname in?

- Interviews en geheugentesten;
- invullen van vragenlijsten;
- bloed- en urineonderzoek;
- eventueel een fMRI en EEG scan in het Amsterdam UMC;
- controle op het ontstaan van verwardheid en geheugenproblemen tijdens de ECT behandelingen;
- indien er verwarring optreedt, wordt het medicijn Rivastigmine via een pleister toegediend.

Deelname is vrijwillig en u kunt ten alle tijden uw deelname beëindigen zonder dat dit van invloed is op uw verdere behandeling. Ook als u besluit niet deel te nemen aan het onderzoek is dit op geen enkele manier van invloed op uw behandeling.

Meer informatie of vragen?

Voor uitgebreide informatie over deelname aan het onderzoek verwijzen wij u graag naar de informatiebrief die u van uw arts heeft ontvangen. Wanneer u nog vragen heeft over het onderzoek kunt u contact opnemen met een onderzoeksassistent van het RECALL onderzoek op recall@ggzingeest.nl.