



PLACEMAT ONDERZOEK

Locatie DNV - Mindway

Aanmelden en meer info via Andrea Weeda of mail naar wetenschapsdesk@ggzingeest.nl

INSOMNIE: EINSTEIN

- ✓ **EINSTEIN: Huidige Depressie en insomnie, leeftijd 18-75 jaar**

Deelname: volgens loting online behandeling voor slaapstoornissen (iCGT-I) voorafgaand aan start reguliere depressiebehandeling. 5 online sessies en enkele f-t-f sessies. Online vragenlijsten (5x) gedurende 12 maanden

- ✗ Werken van nachtdiensten, andere slaapgerelateerde stoornissen, geen dagelijkse toegang tot computer met internet



ANTI DEPRESSIVA: OPERA

- ✓ **<2 maanden geleden gestart met sertraline/citalopram voor depressie, leeftijd 18-75 jaar**

Deelname: om de maand online vragenlijst (6-18 maanden). Telefonische interviews. Mogelijk benadering deelname aan OPERA afbouw studie



- ✓ **PAM: depressie en start antidepressiva**

Deelname: 3 keer een korte online vragenlijst, eHealth module ter ondersteuning van de behandeling met antidepressiva volgen

OCS: OBS, arrIBA, TIPICCO

- ✓ **OBS: OCS, van tenminste matige ernst (Y-BOCS ≥ 16), <6 weken GEEN psychotrope medicatie en geen CGT (gericht op OCS), nooit bewustzijn verloren tgv hoofdtrauma.**

Deelname: voorafgaand aan behandeling bij GiG **psychiatrisch en neuropsychologisch onderzoek en MRI-scans**

- ✗ Huidig of in verleden: eetstoornis, autisme, Tourette, IQ<80. Huidig: zwangerschap



- ✓ **arrIBA: OCS, van tenminste matige ernst (Y-BOCS ≥ 16), geen psychotrope medicatie (of >12 weken in stabiele dosering) en minstens 26 weken geen CGT gehad**

Deelname: volgens randomisatie behandeling middels of **CGT of Inference Based Approach** (45min), 20 weken



- ✓ **TIPICCO: OCS, van tenminste matige ernst (Y-BOCS ≥ 16), eerder antidepressiva of gedragstherapie (>8 sessies) geprobeerd met onvoldoende effect. Medicatie: >12 weken stabiel**

Deelname: 2x per week **rTMS** (45min) met aansluitend **gedragstherapie** (45min), gedurende 8 weken

- ✗ Patient kan niet veilig in MRI scanner, antipsychotica/antihistamine/benzo-gebruik



SUÏCIDE RISICO: GRIP

- ✓ **Suïcide ideatie en/of suïcidale gedragingen in afgelopen maand**

Deelname: volgens randomisatie behandeling van suïcidaal gedrag middels ofwel **reguliere behandeling** ofwel

- ✗ **reguliere behandeling mét Cognitieve Therapie voor suïcide preventie** (CT-sp) & 4 keer vragenlijsten en interview Cognitieve/ neurologische beperking, eerder CGT voor suïcidaliteit ontvangen



**DEELNAME AAN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK IS NIET MOGELIJK IN GEVAL VAN:
ONVOLDOENDE BEHEERSING NEDERLANDSE TAAL, VERSTANDELIJKE BEPERKING, EXCESSIEF MIDDELENGEBRUIK,
PSYCHOTISCHE OF BIPOLAIRE STOORNIS, HOOG SUÏCIDE RISICO (m.u.v. GRIP)**

