

## Het onderzoek

Katatonie is een ernstig ziektebeeld dat voorkomt bij mensen met een depressie, manie of psychose.

Door katatonie kan iemand zich op verschillende manieren gaan gedragen. Soms beweegt iemand urenlang. Of is diegene juist heel lang stijf en stil. Een patiënt begrijpt zelf niet goed wat er tijdens de katatonie gebeurt.

Op dit moment wordt katatonie met medicijnen behandeld door middel van hoge doseringen lorazepam. Als lorazepam niet helpt (bij 25% van de patiënten), is de enige andere behandelingsoptie nog electroconvulsietherapie (ECT).

Daarom zijn wij op zoek naar nog een nieuwe behandeling.

Eerder onderzoek suggereert dat natriumoxybaat een positief effect heeft bij patiënten met katatonie. Natriumoxybaat wordt ook gebruikt als medicijn bij narcolepsie. Wij willen onderzoeken of natriumoxybaat kan worden gebruikt als een nieuwe behandeling bij psychiatrische patiënten met katatonie.

Natriumoxybaat zou een nieuwe behandeling kunnen zijn voor patiënten bij wie lorazepam onvoldoende helpt.

## Wat houdt deelname in?

Het onderzoek bestaat uit twee delen. Om meer kennis op te doen over het beloop van katatonie, zullen patiënten allereerst zorg zoals gebruikelijk ontvangen.

De hoeveelheid lorazepam wordt dan gedurende 4 dagen opgebouwd tot 24 milligram per dag.

Als de symptomen niet duidelijk verminderen, kan de patiënt meedoen aan het tweede onderdeel: de klinische trial.

Patiënten worden in de trial naar één van de volgende twee behandelingen geloot:

- Doorgaan met lorazepam voor 4 dagen
- Afbouw lorazepam in 2 dagen, waarna natriumoxybaat voor 4 dagen

Indien de behandeling werkt, zal deze voor 10 extra dagen binnen de trial doorgaan. Wanneer de behandeling niet werkt, krijgt de patiënt na de trial reguliere zorg. De trial duurt maximaal 20 dagen. Deelnemers ontvangen een kleine vergoeding.

Op de achterzijde vindt u een overzicht van het verloop van het onderzoek.

## Overzicht verloop van het onderzoek



## Wie kan er meedoen?

Patiënten met de volgende kenmerken:

- 18 jaar of ouder
- Katatonie is voor maximaal 8 weken aanwezig
- Het hebben van een depressie, manie of psychose
- Opgenomen in een psychiatrische kliniek

## Meer informatie of vragen?

Deelname is vrijwillig. U kunt te allen tijde de deelname van u of uw naaste beëindigen zonder dat dit van invloed is op het verdere behandelings-traject. Ook als u besluit niet deel te nemen aan het onderzoek is dit op geen enkele manier van invloed op de behandeling.

Voor meer informatie over deelname aan het onderzoek verwijzen wij u graag naar de informatiebrief die u heeft ontvangen. U kunt ook kijken op onze website: [www.laborit-studie.nl](http://www.laborit-studie.nl)

Voor vragen kunt u contact opnemen via [laborit@amsterdamumc.nl](mailto:laborit@amsterdamumc.nl)

Dit is een samenwerking van

