



PLACEMAT ONDERZOEK

AMC - Poli Stemmingsstoornissen

Suïcidaliteit

REPAIR: Attachment Based Family Therapy (ABFT) naast standaard zorg

Bestaat uit: ABFT, 4x gesprek, 5x vragenlijsten

Inclusie: 16-30 jaar, suïcidaliteit (SIQ-JR >30), minimaal 1 ouder kan meedoen

Exclusie: Psychose (actueel of in verleden), ernstige stoornis in gebruik alcohol/cannabis, matig-ernstige stoornis in gebruik van overige middelen



Menstruatie

TIDE: relatie tussen menstruatie en depressie

Bestaat uit: 2-3 maanden kort stemmingsdagboekje, 3x vragenlijsten

Inclusie: 18-45 jaar, regelmatige cyclus (24-35d), behandeling in AMC

Exclusie: Hormonale anticonceptie, zwanger proberen te raken



Roken

INSIST: Very Brief Advice +, verwijzen naar WeQuit voor CGT stoppen met roken via telefoon/videobellen icm stopmedicatie

Bestaat uit: standaard behandeling depressie + bovenstaande

Inclusie: 16+ jaar, roker of vaper, behandeling AMC poli stemming, Engels-/Nederlandstalig

Exclusie: Geen




Microbioom

BUTY: butyraat-suppletie (korteketenvetzuur) als aanvulling bij standaardbehandeling

Bestaat uit: butyraat/placebo, vragenlijsten, feces- en bloedafname

Inclusie: 18-65 jaar, HDRS ≥ 14 , gebruik van antidepressiva, BMI 18,5 tot 27,5, Nederlandstalig

Exclusie: psychose of bipolaire stoornis (actueel of in verleden), ernstige suïcidaliteit, huidige neuromodulatie, ernstige maagaandoening, recent antibioticagebruik



Ken jij een patiënt die geschikt is voor een van de onderzoeken of zou je graag meer informatie opvragen?
Neem contact op met de onderzoekscoördinator:
Marisa Niemeijer - m.j.niemeijer@amsterdamumc.nl



PLACEMAT ONDERZOEK

AMC - Poli Stemningsstoornissen


rTMS

rTMS-SENSE: cognitieve taak tijdens rTMS om effectiviteit te verbeteren

Bestaat uit: taak tijdens rTMS + 3x vragenlijsten, MRI, EEG, ECG

Inclusie: 18-65 jaar, unipolaire depressie, geen response op 2 eerdere behandelingen

Exclusie: bipolaire stoornis, psychotische kenmerken, acute suïcidaliteit, stoornis in middelengebruik, contra-indicaties rTMS (bijv. metalen platen in hoofd/hals, epilepsie)



rTMS-PCT: preventieve cognitieve therapie na rTMS

Bestaat uit: vragenlijsten, wekelijkse sessies PCT: loting voor online of op locatie.

Inclusie: 18-65 jaar, respons op rTMS (50% afname op HDRS of IDS ≤ 7), Nederlandstalig

Exclusie: geen



D-DOTT: standaard rTMS vs versnelde iTBS

Bestaat uit: rTMS/iTBS, MRI, vragenlijsten

Inclusie: 18-65 jaar, unipolaire depressie, geen response op 2 eerdere behandelingen

Exclusie: bipolaire stoornis, psychotische kenmerken, acute suïcidaliteit, stoornis in middelengebruik, contra-indicaties rTMS (bijv. metalen platen in hoofd/hals, epilepsie)



Medicatie & ECT

PROSPECT: kosteneffectiviteit en bijwerkingen van ECT & medicatie

Bestaat uit: eigen behandeling (med/ECT), 4x vragenlijsten, bij ECT 2x psychologische tests

Inclusie: 18+ jaar, unipolaire depressie, start met ECT of antidepressieve medicatie (inclusief additie en esketamine)

Exclusie: Schizofrenie of schizoaffectieve stoornis, huidige stoornis in middelengebruik



Ken jij een patiënt die geschikt is voor een van de onderzoeken of zou je graag meer informatie opvragen?
Neem contact op met de onderzoekscoördinator:
Marisa Niemeijer - m.j.niemeijer@amsterdamumc.nl



Wetenschapsdesk