PLACEMAT ONDERZOEK

DNV Angst

september 2026

Coördinator: Esther Tigchelaar

Aanmeldingen/meer info: wetenschapsdesk@ggzingeest.nl

ANGST: PADOLA, ALPACA

PADOLA: Volgens loting individuele schematherapie (max. 40 sessies binnen 1 jaar) of gebruikelijke zorg (regulier behandelaanbod). Tijdens en na behandeling online vragenlijsten en interviews.
Inclusie: 18-80 jaar (>71 jaar MOCA score 26 of hoger). Diagnose van matige tot ernstige angststoornissen (sociale angststoornis, paniekstoornis, agorafobie, GAS, enkelvoudige fobie, ziekteangst) of OCD. Eerder cognitieve gedragstherapie (tenminste 8 sessies, incl. exposure, gericht op angst) en antidepressiva (tenzij cliënt geen medicatie wil of kan gebruiken) geprobeerd met onvoldoende effect.
Exclusie: Verslaving, acute suïcidaliteit of eerder schematherapie ontvangen.

ALPACA: twee MRI-bezoeken (vóór start en na 2 weken antidepressivum), polshorloge voor hartslag en activiteit (vóór start en tijdens), vragenlijsten (op locatie en via een app)
Inclusie: angststoornis, 18–65 jaar, Nederlandstalig, gaat starten of switchen naar antidepressivum
Exclusie: MRI-contra-indicaties, recente fluoxetine, ernstige neurologische/lichamelijke aandoeningen, ernstige middelenafhankelijkheid

OCS: TETRO

TETRO: volgens loting 4x per week rTMS or placebo rTMS (30min) met aansluitend gedragstherapie (90min), gedurende 5-7 weken, interviews en vragenlijsten
Inclusie: OCS, van tenminste matige ernst (Y-BOCS≥16), eerder gedragstherapie (>8 sessies) geprobeerd met onvoldoende effect
Exclusie: patiënt kan niet veilig in MRI scanner

OVERIG: MARIO

MARIO: korte vragenlijst van 5 minuten en een telefonische screening bij de kinderen en ouders met kinderen onder de 18 van 30 minuten
Inclusie: kinderen van 10-25 jaar van ouders met psychische problemen

Wetenschapsdesk

DEELNAME AAN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK IS NIET MOGELIJK IN GEVAL VAN: ONVOLDOENDE BEHEERSING NEDERLANDSE TAAL, VERSTANDELIJKE BEPERKING, EXCESSIEF MIDDELENGEBRUIK, HOOG SUÏCIDE RISICO